

# Muslingebens- operation med Miller-brænding



Rev. Juli 17

Øre-, næse og halsklinikken  
Dyrehavevej 19  
Hillerød  
Tlf. 48267730

## **Indgreb:**

Indgrebet består af el-koagulations-skrumpning af en eller to nedre muslingebeben i næsen.

## **Formål:**

At skabe bedre plads i næsen til vejrtrækning, lugt og evt. mindske snorken. Udføres oftest når man har forsøgt lokalbehandling med nasal-steroid, grundet allergisk eller hyperaktiv næseslimhinde.

## **Procedure:**

Miller brænding foregår ved at man lokalbedøver med bedøvelse på vat eller gaze og ved injektion under slimhinden sv.t. nederste muslingebeben. Herefter laves 2-5 brændespor under slimhinden for at skrumpe denne umiddelbart samt ved senere arvævs-dannelse.

## **Bivirkninger:**

Sparsom blødning, skorpetendens, umiddelbar hævelse af slimhinden, som kan føre til tæt næse, lette smerter.

## **Efter indgrebet:**

Der tilrådes i efterforløbet saltvands-skylning evt. med hypertontisk saltvand, evt. Otrivin spray i særlige tilfælde for at skabe god luftpassage.

Effekt kan først påregnes efter flere Uger.

Der kan tages smertestillende Panodil NSAID præparater efter behov.

Ved vedvarende gener kontaktes klinikken før kontroltiden 3 uger efter.