

Vigtigt før operationen:

Der må ikke indtages blodfortyndende medicin 2 uger før, samt 2 uger efter indgrebet, eks.: Acetylsalisylsyre.

Der må ikke i samme periode, indtages kosttilskud/alternativ medicin med: Fiskeolie, hvidløg, ingefær, ginseng og ginkgo biloba.

Fjernelse af børnepolypper

Rev.feb.2018

Øre-, næse og halsklinikken
Dyrehavevej 19
Hillerød
Tlf. 48267730

Hvad er børnepolypper:

- En del af svælgets immunforsvar
- Alle har større eller mindre polypper
- Få har for store polypper
- Ikke det samme som næsepolypper
- Forkølelsesvirus sætter sig i børnepolypperne, så de vokser

Hvorfor børnepolypfjernelse:

- Børnepolypfjernelse foretages for at bedre luftpassagen i næsen
- Nedsætte tendensen til kronisk forkølelse
- Bedre funktionen af det eustakiske rør og derved forbedre hørelsen ved ophør af langvarigt undertryk med slim i mellemøret

Problemer ved børnepolypfjernelse

- Operationen foregår i fuld bedøvelse
- Kun få gener
- Let blødning fra næsen. Vi anbefaler en dag hjemme, blød kost og ingen varme drikke eller varm mad det første døgn, is er altid en god ting!
- Der er ingen smerter eller få smerter efter indgrebet, men ofte irritation i hovedet efter bedøvelsen
- Der kan imidlertid opstå åbent snøvl (ændret tale) et stykke tid efter operationen pga. ændret resonansrum

Grunde til manglende effekt af polypfjernelse

- Allergi eller fortykket slimhinder i næsen
- Skæv næseskillevæg
- Fortsat snævre eustakiske rør
- Gendannelse af børnepolypper kan forekomme

Derfor er regelmæssig kontrol vigtig