

Muslingebens- operation med Miller-brænding



Øre-næse-hals-klinikken

Dyrehavevej 19

3400 Hillerød

Tlf.: 4826 7730

www.dyrehavevej19.dk

Revideret oktober 2018/hr

Indgreb

Indgrebet består af varme-skrumpning af en eller to nedre muslingebeben i næsen.

Formål

At skabe bedre plads i næsen til vejrtrækning, lugt og evt. mindske snorken. Uføres når man har forsøgt lokalbehandling med nasal-steroid, grundet allergisk eller hyperaktiv næseslimhinde.

Procedure

Miller-brænding foregår ved at man lokalbedøver med bedøvelse på vat eller gaze og ved indsprøjtning under slimhinden sv.t. nederste muslingebeben. Herefter laves 2-5 brændespor under slimhinden for at skrumpe denne umiddelbart samt ved senere arvævs-dannelse.

Bivirkninger

Sparsom blødning, skorpetendens, umiddelbar hævelse af slimhinden, som kan føre til tæt næse, lette smerter.

Efter indgrebet

Der tilrådes i efterforløbet saltvandsskylning evt. med hypertonisk saltvand, evt. Otrivin spray i særlige tilfælde for at skabe kortvarig bedre luftpassage.

Effekt kan først påregnes efter flere uger.

Der kan tages smertestillende *Panodil*, *NSAID*- præparater efter behov.

Ved vedvarende gener kontaktes klinikken før kontroltiden 3 uger efter.